



Zone de culture

Seigle d'hiver


Sem-Partners

La nouvelle dynamique des semences

Fiche technique mise à jour décembre 2015

ELEGO

Performances et qualité



Les plus

- Adapté à toutes zone de culture et tous types de sols
- Adapté aux semis de Septembre à Octobre
- Très bonne qualité du grain
- Très résistant au froid et à la verse
- Très tolérant à l'ensemble des maladies
- Productivité équivalente aux variétés hybrides
- Débouchée : Alimentation animale et Meunerie

→ Doté d'une bonne fertilité d'épis et d'un très gros PMG, ELEGO est très productif en zone non stressante. Sa teneur en protéines et ses aptitudes à la panification, en font un excellent candidat pour les débouchés meuniers.

Critères agronomiques

Type : Hiver

Précocité à épiaison et maturité: ½ Précocité

Résistance à la verse : Très bonne

Résistance au froid hivernal : Excellente

Hauteur en végétation : Moyenne à haute

Maladies : Très bonne tolérance globale

Qualité

Pois Spécifique : Très bon

Teneur en protéines : Bonne

Bonne tolérance à la germination sur pied → Indice de Hagberg très élevé (7, Supérieur à de nombreux hybrides)



Hiver



½ précocité



PS, et teneur en protéine élevés



Excellente tolérance aux maladies




Adapté aux débouchés meuniers et alimentation animale




Les données mentionnées ne sont qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales.

La résistance aux maladies ne concerne que les maladies ou souches actuellement connues et étudiées en France

www.sem-partners.com



Particularité
D.AMBER est ½ précoce. Il résiste très bien au froid



Sa fertilité d'épis et son gros PMG en font un excellent candidat productivité en zone non stressante.

Particularité
Très bon comportement global vis à vis du complexe des maladies.

Particularité
Confirme de très bons rendements

L'espèce « seigle » est sensible à l'**ergot**, maladie qui dévalorise la récolte soit en perte économique directe, soit par une pollution toxique pour les animaux et les humains qui en consomment. Le degré de contamination de la culture est variable d'une année à l'autre et dépendant des conditions climatiques durant la floraison; le temps frais et humide favorise l'implantation des spores d'ergot sur les fleurs. La source d'infection de la culture provient généralement des graminées « hôtes » des bordures de champs. Les variétés qui tallent et fleurissent de façon inégale ou qui ont un haut degré de stérilité sont souvent plus affectées par l'ergot.

Important : La sévérité de l'ergot chez le seigle d'hiver diminue lorsqu'on augmente la densité de semis

Particularité
Précautions vis-à-vis de l'ergot du seigle

La densité de semis dépend de la date et des conditions d'implantation de la culture: prévoir entre 220 à 240 grains/m² dans des conditions optimum de semis de septembre/octobre et 240 à 280 grains/m² pour les semis plus tardifs; l'objectif étant d'obtenir au moins **450 épis / m²**. Un surpeuplement risque d'entraîner une verse excessive et un sous peuplement, une sensibilité plus marquée à l'ergot. Il est possible de n'appliquer aucun traitement fongicide sur **ELEGO** mais il est conseillé de surveiller les attaques de rouilles. Bien que peu sensible à la verse, en situation de fort développement végétatif, il est conseillé d'appliquer un régulateur entre le stade 2 nœuds et sortie dernière feuille. La fumure azotée est raisonnée en fonction de l'objectif de rendement et du précédent cultural suivant la méthode du bilan N en veillant à limiter le 1er apport. Viser un apport de 2,5 à 2,8 unités par quintal sur l'objectif de rendement. **ELEGO** ne nécessite pas de précautions particulières pour le battage; prévoir un réglage du contre batteur adapté au volume de paille.