



- Tolérante à la rhizomanie
- Homogénéité et régularité de ses collets
- Tare terre limitée, conservation facilitée





Facile à arracher, facile à conserver





Identification

Couleur: rouge

Type: fourragère sucrière cylindro conique Forme: Très résistante : montée à graine rhizomanie Résistante :

Moyennement enterrée

Type de sol

Pour les betteraves, un pH de 6,5 à 7 est souhaitable. En cas de chaulage : veiller à le réaliser sur la culture précédente afin d'éviter la maladie du coeur creux.

Préparation du sol

S'assurer que la parcelle est propre avant de semer : si nécessaire pratiquer un faux-semis, suivi ou non d'un désherbage. Le sol doit être meuble en profondeur et bien émietté en surface.

Semis

Utiliser un semoir de précision. Semer le plus tôt possible, à 2 ou 3 cm de profondeur, dans un sol bien ressuyé et chaud : 7 à 10°C.

Semer 120 à 130 000 graines/ha afin d'obtenir un peuplement de 90 à 100 000 plantes.

Protection de la culture

Ne pas hésiter à désherber la jeune culture afin de préserver sa population, son rendement et sa qualité. Le premier mode de désherbage reste toutefois le binage, réalisé dès l'apparition des rangs.

Fertilisation

Réaliser une analyse de sol pour ajuster les apports. Pour une production de 1 tonne de MS, les exportations sont:

N: 15 à 20 kg P2O5: 8 à 9 kg K2O: 30 à 35 kg Les betteraves valorisent très bien la fumure organique à condition de réaliser celle-ci en début d'hiver.

Autres conseils agronomiques

Eviter les retours à moins de 3 ou 4 ans sur une même parcelle. S'assurer de la bonne disponibilité en Bore. Utiliser des variétés résistantes à la rhizomanie en zone infestée.

Récolte

Récolter les betteraves à mâturité, saines et entières. Eviter de les décolleter et de les blesser.

Date de création: 09/2014.



Caractères agronomiques

RIBAMBELLE

Teneur en MS

Valeur exprimée en % des témoins

Jay

Source: CTPS

Rendement en matière sèche soluble (entonnes / ha)

Valeur exprimée en % des témoins

RIBAMBELLE Témoin 105,88 100

Source: CTPS. Témoin = Jary. Zone touchée par la rhizomanie

- RIBAMBELLE se caractérise par son excellente productivité. Sa tolérance à la Rhizomanie lui permet de creuser encore l'écart avec les autres variétés en zone infestée.
- Facile à arracher, présentant une très bonne conservation, elle satisfera les éleveurs les plus exigeants.
- RIBAMBELLE présente le bon niveau en matière sèche pour être consommée entière par des bovins.
- Elle conviendra parfaitement pour l'alimentation d'un troupeau de laitières à haut potentiel.
- Notre conseil de semis :

Peuplement recherché en plantes/ha	90 à 100 000 plantes				
Ecartement inter rangs en cm	45 cm			50 cm	
Ecartement sur le rang en cm	17	18	19	16	17
Nombre de graines à semer à l'ha	130 000	125 000	120 000	125 000	120 000

- Semer au printemps sur sol réchauffé
 - Du 15 mars à fin avril selon les régions