



# Cérience

L'AGRONOME SEMENCIER



# PIPER

## SORGHO FOURRAGER

**UNE PRODUCTION DE FOURRAGE  
DÈS LE DÉBUT DE L'ÉTÉ.**



# PIPER

## Caractéristiques :

- Sorgho fourrager
- Multicoupe type Sudan grass

## Profil:

- Courte durée
- Pérennité :**
  - 3 à 4 mois
  - (exploitation entre juillet et octobre)

## Types de sol :

- Tous types

## Dose (kg/ha) :

- 20 à 25 kg/ha en pur

## SES ATOUTS

- **PIPER permet une production de fourrage dès le début de l'été même en conditions sèches :**
  - Le type Sudan grass permet en effet une production précoce de biomasse.
  - De plus la variété PIPER se caractérise par une bonne tolérance aux températures basses et une teneur en acide cyanhydrique faible par comparaison aux autres types de sorgho, permettant une exploitation à un stade jeune (50-60 cm) même en pâturage.
- **PIPER offre également une souplesse dans l'exploitation du fourrage produit :**
  - Son fort pouvoir de tallage, ses tiges fines et ses feuilles nombreuses garantissent une bonne repousse et une production constante entre les coupes.
  - Sa valorisation est possible aussi bien en fauche (affouragement en vert, enrubannage, ensilage) qu'en pâturage.



**HappyGRASS**  
Votre assistant prairie

HappyGrass est le bouquet d'application dédié à la gestion de vos prairies et du pâturage. Il contient de nombreux outils notamment pour :

- composer vos prairies, méteils et dérobées en fonction de vos objectifs et des caractéristiques pédoclimatiques de votre parcelle ;
- définir les besoins en fertilisation azotée ;
- visualiser les fenêtres météo pour organiser vos chantiers de récolte ;
- saisir et valoriser vos données liées à la gestion du pâturage.

[www.happygrass.fr](http://www.happygrass.fr)

## POUR QUELLES SITUATIONS ?

Pâturage	Fauche

### Semis :


- Semer sur un sol réchauffé (12°C minimum) après les semis de maïs ou de cultures dérobées au cours de l'été ;
- Semer à une profondeur optimale de 2-3 cm.

### Fertilisation :

- Un apport d'azote est recommandé après chaque coupe afin de favoriser la repousse (30 unités/ha) ;
- Un apport de fond de phosphore et de potasse est également conseillé afin de compenser les exportations (60-80 unités de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et de K<sub>2</sub>O/ha).
- Les apports sont à ajuster en fonction des teneurs du sol, des objectifs de rendement et des restitutions des animaux en cas de pâturage.



Conditionnement :  
Sac de 25 kg



2021 • Document non contractuel.

Les informations contenues dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions pédoclimatiques et culturales.

**cerience**  
L'AGRONOME SEMENCIER

Route de la Ménitrie - Beaufort-en-Vallée –  
49250 BEAUFORT EN ANJOU - FRANCE  
Tél : + 33 (0)241 796 320  
[www.cerience.fr](http://www.cerience.fr)