




RAY-GRASS ANGLAIS 4N



# SORAYA

GRANDE MASSE DE FEUILLES

# RAPIDEMENT



Très bonne tolérance aux influences hivernales

Conservation plus facile en ensilage

Bouclier contre les maladies en toutes saisons



TRÈS BONNE  
TOLÉRANCE AUX  
INFLUENCES  
HIVERNALES

CONSERVATION  
PLUS FACILE EN  
ENSILAGE

BOULIER  
CONTRE LES  
MALADIES EN  
TOUTES SAISONS

## IDENTIFICATION

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>PLOÏDIE</b>   | <b>tétraploïde</b>   |
| <b>TARDIVETÉ</b> | <b>intermédiaire</b> |
| <b>PÉRENNITÉ</b> | <b>5 ans</b>         |
| <b>ÉPIAISON</b>  | <b>19 mai</b>        |
| <b>SOUPLESSE</b> | <b>53 jours</b>      |

SORAYA se développe rapidement après le semis et forme un gazon très dense.

Il convient particulièrement bien pour une utilisation en fauche intensive et en pâture.

Sa très bonne résistance aux maladies, en particulier contre la rouille couronnée, assure une bonne qualité de fourrage sur les repousses d'été et d'automne.

## CARACTÈRES AGRONOMIQUES

### Souplesse d'exploitation

Durée en jour



### Pérennité

De 1 à 9 = très pérenne




### Vigueur en sortie d'hiver

De 1 à 9 = élevée



### Résistance aux rouilles

De 1 à 9 = résistant



Sources CTPS

## RENDEMENT EN MATIÈRE SÈCHE

|             |                                | SORAYA | TÉMOIN |
|-------------|--------------------------------|--------|--------|
| Pluriannuel | 1 <sup>ère</sup> coupe (A2+A3) | 4,96   | 4,2    |
|             | Printemps (A2+A3)              | 14     | 13,5   |
|             | Été-Automne (A2+A3)            | 5,1    | 4,8    |

Source: CTPS. Témoin = (Proton + Cantalou)/2

## DOSES DE SEMIS

30 kg/ha en pur

## PÉRIODES DE SEMIS

- > Du 15 mars à fin avril
- > Du 15 août au 15 novembre

## RECOMMANDATIONS CULTURALES

**Préparation du sol** : Ferme en profondeur, fine en surface

**Profondeur de semis optimale** : 1 cm - Rouler après semis

**Surveiller** la présence d'adventices et de ravageurs, intervenir si nécessaire

**Fertilisation** : En fonctions des besoins de la culture et des analyses de sols

## ASSOCIATIONS POSSIBLES

SORAYA  
(25KG)



+ T. BLANC LADINO (3 À 5KG)

SORAYA  
(20KG)



+ T. VIOLET (8KG)

SORAYA  
(15 À 20KG)



+ RGA 2N (7 À 10KG) + T. BLANC INTERMÉDIAIRE (3 À 5KG)

SORAYA  
(10KG)



+ RGA 2N (5KG) + F. ÉLEVÉE (10KG)

+ T. BLANC INTERMÉDIAIRE (3 À 5KG)

+ RGA 2N (5KG) + DACTYLE (7KG)

+ T. BLANC INTERMÉDIAIRE (3 À 5KG)

